

# Esquema de vacunación en Adultos\*



## Tétanos, difteria Td



Si tiene el antecedente de esquema completo de inmunización oficial con Td en la infancia, se debe revacunar cada 10 años con 1 dosis adicional.

Si no tiene comprobante de vacunación de Td o el esquema está incompleto, se aplica esquema 0-1-6  
(El día cero corresponde a la primera dosis aplicada, la segunda dosis se aplica al mes de la primera dosis y finalmente la tercera dosis puesta a los 6 meses posteriores de la primera aplicación).

Se aplica refuerzo cada 10 años con 1 dosis. Incluye población a partir de los 10 años.

## Influenza



Para todos los adultos **mayores de 18 años** con factores de riesgo y para todos los **mayores de 60 años**.

## Neumococo 13 Valente



Una dosis **única** en adultos con factores de riesgo.

## Neumococo 23 Valente



Una dosis **única** a partir de los 65 años de edad.

NOTA: La vacuna está indicada para niños a partir de los 2 años con factores de riesgo, por ejemplo: en niños con problemas respiratorios.

## Tdap

Tétanos, difteria y pertusis



En embarazadas a partir del **tercer trimestre** del embarazo.

Adaptado de Esquema Oficial de Vacunación en Adultos - Costa Rica 2022. Ministerio de Salud de Costa Rica

Cada vacuna aplicada es el inicio de una

# #Cadenadevida